




Arbres, triangulations,
molécules d'ARN:
quelles mathématiques,
quelle informatique ?



xavier viennot
LaBRI, CNRS, Université Bordeaux 1



Leonh. Euler 300


300. Geburtstag

300^{ème} anniversaire

300° anniversario

300th anniversary





Leonhard
Euler

Opera Omnia, 80 volumes



Eneström E001, E800
40 livres

correspondance 3000 lettres


mathématiques, physique,
optique, mécanique, astronomie,
sciences et techniques, “ingénierie”,
navigation, géographie, musique

grand pédagogue

Polyèdre convexe




$$S - A + F =$$
$$8 - 12 + 6 = 2$$



Une lettre oubliée d'Euler
à Christian Goldbach

Berlin, 4 Septembre 1751



$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

$$= \frac{(2n)!}{(n+1)! n!}$$

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$$

$$C_4 = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}$$

$$= 14$$

1 1 2 5 14 42

nombres de Catalan



NOVI
COMMENTARII
ACADEMIAE SCIENTIARVM
IMPERIALIS
PETROPOLITANAE

TOM. VII.

pro Annis MDCCLVIII. et MDCCLIX.



MDCCCLXII

PETROPOLI

TYPIS ACADEMIAE SCIENTIARVM

MDCCCLXI.

VI.

Enumeratio modorum , quibus figurae
planæ rectilineæ per diagonales diui-
duntur in triangula.

Auct. I. A. de Segner pag. 203.

Quando in Geometria area figurarum pluribus lateri-
bus inclusarum definiri debet , eae per diagonales
in triangula resolui solent , quia tum cuiusque trianguli
areae ex cognitis lateribus facile determinantur. Quo
pluribus autem lateribus figura est praedita , eo pluribus
modis eam hoc modo in triangula resolui posse , vel
leuiter attendenti statim est manifestum. Ita cum in
quadrilaterum duas diagonales ducere liceat , quadrilate-
rum duplici modo in bina triangula diuiditur. Penta-
gonum autem quintuplici modo , diagonalibus ducendis ,
in triangula resolui posse reperitur , hexagonum vero
14 modis , et heptagonum 42 modis , octogonum 132
modis , enneagonum 429 modis etc. quae omnium
modorum possibilium enumeratio , quo magis cum la-
terum numero eorum multitudo crescit , eo fit diffici-
lior et taediosior. Quare quaestio omnino curiosa , et
Geometrarum attentione digna videtur , qua lege isti
resolutionum numeri pro laterum multitudine progre-
diantur , vt inde pro quouis polygono resolutionum nu-
merus rite definiri queat ? Hinc Ill. Auctor modo prorsus
singulari et ingenioso legem progressionis horum nu-

merorum exponit, ac rigoroſe demonſtrat, dum docet, quomodo pro quouis polygono reſolutionum numerus, ex cognita reſolutione polygonorum ſimpliciorum, quae paucioribus conſtant lateribus, colligi debeat. Hac ratione, ſi a ſimpliciſſimis incipiamus, hanc inueſtigati-
nem continuo ad polygona plurium laterum extendere licet; ſicque Ill. Auſtor ſub finem tabellam adiecit, in qua iſtiusmodi reſolutiones ad polygona 20 laterum uſque exhibet. Liceat autem nobis, a ſummo quodam Geome- tra, qui eandem hanc tabulam calculo ſubiecit, admonitis, obſeruare, hanc tabulam, ob quendam calculi errorem, tantum uſque ad polygona 15 laterum eſſe iuſtam, quip- pe pro hoc polygono reſolutionum numerus non eſt 751900, ut tabella habet, ſed 742900, ſequentes quoque numeri, dum forte nouus error irrepiſit, pri- mo ad 17 uſque latera nimis ſunt magni, deinde ve- ro nimis parui, dum pro 20 lateribus reſolutionum numerus eſt 477638700. Facilius haec apparent, ſi ex lege primum obſeruata, qua quilibet numerus ex omnibus praecedentibus colligitur, alia ad computum facilior eliciatur, cuius ope quilibet numerus ex ſolo praecedente definiatur. Ita ſi pro polygono n laterum numerus reſolutionum ſit P , pro polygono ſequenti $n+1$ laterum numerus reſolutionum erit $\frac{n+1}{n} P$. Quin etiam hinc, ſine conſideratione praecedentium, ſtatim indefinite pro polygono n laterum numerus re- ſolutionum ita per factores exprimitur, ut ſit:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{6}{4} \cdot \frac{10}{5} \cdot \frac{14}{6} \cdot \frac{18}{7} \cdot \frac{22}{8} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n}$$

ubi numeratores quaternario, denominatores uero uni-
tate creſcunt. Hinc ſequentem nouam tabulam, bene-
vole

vole nobiſcum communicatam, adiungere e re viſum eſt, quod Ill. Auſtori huius ſchediaſmatis non diſpli- citurum eſſe ſperamus.

Num. laterum	numerus reſolutionum.	num. laterum	numerus reſolutionum.
III	1	XV	742900
IV	2	XVI	2674410
V	5	XVII	9694845
VI	14	XVIII	35357670
VII	42	XIX	129644790
VIII	132	XX	477638700
IX	429	XXI	1767263190
X	1430	XXII	6564120420
XI	4862	XXIII	24466267020
XII	16796	XXIV	91482563640
XIII	58786	XXV	343059613650
XIV	208012		

VII.

Methodus ſimplex et vniuerſalis omnes
omnium aequationum radices dete-
rmini


$$2(2n+1)C_n = (n+2)C_{n+1}$$


Complures iam a Geometris excogitatae ſunt me-
thodi aequationum algebraicarum radices, vel ac-
curate, vel proxime ſaltem, determinandi: omnes au-
tem fere poſtulant, ut valores radicum, quae quae-
runtur,

$$\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

au 20^{ème} siècle ...

les arbres binaires





Arbre

=



Arbre

Arbre

$C_n =$ nombre
d'arbres binaires
ayant n
sommets internes

(et donc $n+1$ feuilles)


nombre de Catalan


recurrence


$$C_{n+1} = \sum_{i+j=n} C_i C_j$$


$$C_0 = 1$$


des triangulations
aux arbres binaires

















calcul d'une expression arithmétique

$$\frac{(a+b)}{c(d+e)} + (f-g)h$$




Pebbles problem







$\max(k, k')$





$k+1$





dessine moi un arbre













synthèse d'images d'arbres













S'il existe une quelconque beauté dans ces images de synthèse d'arbres, elle n'est que le pâle reflet de l'extraordinaire beauté des mathématiques se cachant derrière les algorithmes générant ces images.

Nombre de **Strahler** **moyen**
d'un arbre linéaire ayant n sommets

$$A_n =$$

Nombre de **Strahler** **moyen**
d'un arbre binaire ayant n sommets

$$A_n = \log_4 n +$$

Nombre de **Strahler** **moyen**
d'un arbre binaire ayant n sommets

$$A_n = \log_4 n + \underbrace{f(\log_4 n)}_{\text{périodique}} + \dots$$



$$x^3$$



$$-x$$





$$-x$$

$$F_3(x) = x^3 - 2x$$


$$\sin(4\theta) = \sin \theta [8 \cos^3 \theta - 4 \cos \theta]$$


$$\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta)$$








$$w = \sigma_2 \sigma_3 \sigma_5 \sigma_1 \sigma_4 \sigma_1 \sigma_3$$






















visualisation de l'information ...




Tulip
D. Auber


des arbres dans les molécules ...




tARN^{Phe}



tARN^{Phe}



tARN^{Phe}






Fig. 1. Secondary structure model of the 16S RNA from *E. coli*. This model has been fully described elsewhere [18]. The various secondary structure motifs are numbered for reference. Base-pairings 2 and 23 are included in this up-dated scheme and slight modifications have been introduced into helices 18b and 33b





Fig. 1. Secondary structure model of the 16S rRNA from *E. coli*. This model has been fully described elsewhere [18]. The various secondary structure motifs are numbered for reference. Base-pairings 2 and 23 are included in this up-dated scheme and slight modifications have been introduced into helices 18b and 33b

Electrodynamique quantique


Richard Feynman

Renormalisation








Alain Connes







Richard Feynman





Alain Connes

Géométrie non commutative

Renormalisation

$$\begin{array}{c}
 P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \quad P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \end{array} = P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array} + P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array} + P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array} \\
 + P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array} + P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array} + P \quad \begin{array}{c} \bullet \\ \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \end{array}
 \end{array}$$

$$\sigma^\gamma(\Upsilon\Upsilon) = \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---}$$

$$\sigma^\gamma(\Upsilon\Upsilon) = \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---}$$


$$\sigma^\gamma(\Upsilon\Upsilon) = \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---}$$

$$\sigma^\gamma(\Upsilon\Upsilon) = \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}\bigcirc\text{---}$$


$$\sigma^\gamma(\Upsilon\Upsilon) = \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}$$

$$+ \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}$$

$$+ \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---} + \text{---}\bigcirc\text{---}$$



Physique



combinatoire



Leonhard
Euler



Il y a des arbres dans les étoiles,
des arbres dans les grains de lumière.

Les théories mathématiques s'interpellent,
s'entrecroisent, renaissent, se fondent entre elles.

Les grands Maîtres se parlent à travers les siècles
dans le jardin merveilleux des Mathématiques.


épilogue


















Trees everywhere



tARN^{Phe}















c'est la fin

Merci à tous !